

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (HIV) EM RECÉM NASCIDOS À TERMO

Vanessa Imada (Hospital LA TIMONE), Armando Paz Paredes (Hospital LA TIMONE), Didier Scavarda (Hospital LA TIMONE), Gabriel Lena (Hospital LA TIMONE)

Resumo

INTRODUÇÃO : A ocorrência de HIV é mais freqüente e descrita nos prematuros. Entretanto, devido às alterações motoras e cognitivas que podem ocorrer também nos recém nascidos à termo, nesses faremos um estudo para a melhor compreensão. **OBJETIVO :** Realizamos um estudo retrospectivo dos pacientes que tiveram HIV nascidos à termo e os comparamos com os dados existentes na literatura sobre prematuros ; assim avaliamos se a patologia e o prognóstico são os mesmos apesar de idades diferentes. **MATERIAL E MÉTODOS:** Em nosso serviço, (em andamento a atualização dos dados até 2009), em nosso estudo primordialmente, em um período de 30 anos (1978-2005), foram analisados os prontuários desses pacientes. Avaliamos dados do nascimento, tempo e clínica do diagnóstico, resultados laboratoriais e de imagens, conduta terapêutica e prognóstico. Ainda, avaliamos a qualidade de vida baseado na escala de Lansky, informação essa fornecida conforme a última consultação e/ou em sua ausência enviamos uma carta ao pediatra. **RESULTADOS E CONCLUSÕES :** 19 meninos/12 meninas . Vinte e oito (90%) na grade III ou IV da classificação de Papille. Tempo médio para o diagnóstico foi de 7.5 dias (0-45 dias). Dezenove(61%) das crianças foram tratadas com drenagem ventricular externa (DVE), o tempo médio da permanência dessa DVE foi de 14 dias (10-24) e sem nenhum caso de infecção. 25(80%) das crianças evoluíram com hidrocefalia e dessas, 16(64%) precisaram de uma reoperação da DVP devido obstrução. Oito casos de estrabismo. Quatorze em tratamento para epilepsia. Atraso do desenvolvimento psicomotor em 8 crianças (30.76%). Sete freqüentam escolas especiais. **CONCLUSÕES:** Em nosso estudo percebemos que há uma relação inversa da classificação de Papille com a escala de Lansky, isto é, quanto mais grave o sangramento, mais a qualidade de vida será agravada. A HIV nos nascidos à termo é a mesma patologia que ocorre nos prematuros e o prognóstico, apesar de ser mais ameno nos nascidos à termo, é também igualmente reservado.

Vanessa Imada, vanessaimada@gmail.com