

## PARASITOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Carlos Fernando Dabdoub Arrien (*Hospital Japones*), Carlos Benjamin Dabdoub R. (*Hospital da Restauração*)

### Resumo

De las parasitosis que con mayor frecuencia en América Latina producen diversos cuadros neurológicos en la infancia, se citan la neurocisticercosis y el quiste hidatídico. En el caso de la neurocisticercosis, sobre una serie de 71 casos, la mayor incidencia se encontró entre los 5 y 9 años. El inicio de la enfermedad se caracterizó particularmente por cefalea (42%), convulsiones (38%) y vómitos (65%). En aquellos casos que se acompañaron de hidrocefalia, fue necesario hacer revisión del shunt en un 82%, sobre todo por obstrucción del catéter ventricular (65 %) o distal (12 %) o por infección (40 %). Se hace una revisión bibliográfica de ambas enfermedades, haciendo énfasis en el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento clínico y quirúrgico, y la evolución de estos enfermos. Por último, se analizan los hallazgos encontrados en esta serie y se los compara con la casuística de otros autores, presentándose finalmente algunas conclusiones.

**Carlos Fernando Dabdoub Arrien**, cdabdoub@hotmail.com