

PREVALÊNCIA DE ÓBITOS NO ESTADO DE ALAGOAS POR DISTÚRBO DA FORMAÇÃO DO TUBO NEURAL(DFTN) NOS ANOS DE 2000 À 2008

Programa de Saúde da Família(PSF), Maragogi-AL

Alencar, NM

Objetivo: Analisar a prevalência de óbitos por DFTN no estado de Alagoas no período de 2000 à 2008.

Materiais e Métodos: Foram coletados dados no SIM(Sistema de Informação de Mortalidade) da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, referente aos anos de 2000 a 2008, de óbitos por DFTN(mais especificamente anencefalia e espinha bífida).

Resultados: Observou-se no estudo referido que nos anos de 2000 à 2002 e 2003 à 2005(pós-implantação de ácido fólico) não houve redução de óbitos por anencefalia. Porém, nos anos de 2006 à 2008 já verificou-se uma redução entre os óbitos de 26,32%. Falando-se em óbitos por espinha bífida, os resultados mostram nos anos de 2000 à 2002 e 2003 à 2005(pós-implantação de ácido fólico) uma diminuição de 10% e no período de 2006 à 2008 esse número foi notavelmente reduzido em 66,67%.

Conclusão: conclui-se que a diminuição de óbitos por DFTN(anencefalia e espinha bífida) a partir de 2002 foi resultado da suplementação nutricional do ácido fólico durante a assistência ao pré-natal em especial no primeiro trimestre da gestação com objetivo de uma ação preventiva.